

Stoppen van bloedverdunners voorafgaand aan endoscopisch onderzoek

Uw behandelend medisch specialist vindt het noodzakelijk dat er een endoscopisch onderzoek wordt verricht. Om dit onderzoek zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat bepaalde bloedverdunners worden gestopt. In dit schema geven wij u hier meer informatie over.

Naam:.....

Geboortedatum:.....

Datum onderzoek:.....

Nieuwe orale anti coagulantia (NOAC)

| Soorten bloedverdunners | Uw bloedverdunner | Stop | Stopdatum |
|-------------------------|-------------------|--|-----------|
| Dabigatran (Pradaxa ®) | | <input type="checkbox"/> 48 uur tevoren <input type="checkbox"/> 72 uur tevoren (afhankelijk van de nierfunctie) | |
| Rivaroxaban (Xarelto ®) | | 48 uur tevoren | |
| Apixaban (Eliquis ®) | | 48 uur tevoren | |
| Edoxaban (Lixiana ®) | | 48 uur tevoren | |

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Thrombocyten aggregatie remmer

| Soorten bloedverdunners | Uw bloed verdunner | Stop | Stopdatum |
|---|--------------------|--|-----------|
| Acetylsalicylzuur, Ascal®, Carbasalaatcalcium | | <u>niet</u> stoppen | |
| Clopidogrel (Grepid®, Plavix®, Iscover®) | | <input type="checkbox"/> 5 dagen tevoren <input type="checkbox"/> <u>niet</u> stoppen | |
| Prasugrel (Efient®) | | 7 dagen tevoren | |
| Ticagrelor (Brilique®) | | 3 dagen tevoren | |
| Dipyridamol (Persantin®) | | 48 uur tevoren | |
| Asasantin® (Acetylsalicylzuur en Dipyridamol) | | 48 uur tevoren | |

Vitamine K-antagonisten

| Soorten bloedverdunners | Uw bloed verdunner | Stop | Stopdatum |
|----------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Acenocoumarol (Sintrom ®) | | 3 dagen tevoren | |
| Fenprocoumon (Marcoumar ®) | | 7 dagen tevoren | |

Patiënten die Vitamine K-antagonisten gebruiken, verzoeken wij om zelf de trombosedienst op de hoogte te brengen.

Na de scopie

Uw behandelend medisch specialist geeft na het onderzoek aan wanneer u uw bloedverdunners weer kunt innemen.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van deze folder?

Neem dan contact op met het MDL-centrum. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur op telefoonnummer 088 708 70 70.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.