

Dubbelblinde voedselprovocatie

Met behulp van deze test kan worden nagegaan of u allergisch bent voor een bepaald voedingsmiddel. Dit onderzoek zal tweemaal plaatsvinden: eenmaal met het voedingsmiddel zelf en eenmaal met een placebo. Zowel u als degene die het onderzoek bij u afneemt weet niet wanneer u het voedingsmiddel of placebo krijgt. Dit wordt ook wel een dubbelblinde test genoemd. Het onderzoek duurt ongeveer 3,5 uur.

Verloop van het onderzoek

Tijdens het onderzoek krijgt u verschillende hoeveelheden van het voedingsmiddel aangeboden. Dit voedingsmiddel zit dan ergens in "verstopt" en is dus niet als zodanig te herkennen. Hierbij wordt steeds gekeken of er zich klachten ontwikkelen. Bij een duidelijk klachtenbeeld zal de test worden gestaakt.

Vorbereidingen thuis

- Medicijnen tegen allergie en enkele antidepressiva dienen 72 uur van tevoren worden gestaakt, echter hierover altijd vooraf overleg met allergoloog (zie medicijnlijst z.o.z.).
- Longmedicatie dient op tijd gestaakt te worden (zie medicijnlijst z.o.z.).
- B-blockers (bepaalde bloeddruk medicijnen) dienen 48 uur van tevoren worden gestaakt, echter hierover altijd eerst vooraf overleg met de allergoloog.

Uitslag

Uw behandelend medisch specialist deelt u de uitslag van het onderzoek mee.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel ze dan gerust. Tijdens kantooruren kunt u ook bellen naar de polikliniek allergologie ZGT, telefoonnummer 088 708 52 30.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTInfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTInfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Medicijnenlijst t.b.v. medicijnprovocatie

Medicijnen tegen allergie en jeuk 72 uur van tevoren staken

Acrivastine	mebhydroline
Aerius	mizolastine
Alimemazine	Mizollen
Allerfre	montelukast
Allergodil (Azelastine)	Nalcrom
Atarax	Neoral
Cetirizine	oxatomide
Ciclosporine	Periactin
Claritine	Polaramine
Clemastine	Prevalin
Cromoglicinezuur	promethazine
Cyproheptadine	Reactine
Desloratadine	Rupatadine
Dexchlorfeniramine	Rupafin
Dimetindeen	Semprex
Dymista	Singulair
Ebastine	Tavegil
Fenistil	Telfast
Fexofenadine	terfenadine
Hydroxyzine	Tinset
Kestine	Xyzal
Ketotifen	Zaditen
Levocetirizine	Zyrtec
Livocab(Levocabastine)	
Lomudal	
Loratadine	

Medicijnen tegen misselijkheid/duizeligheid 72 uur van tevoren staken

Betahistine	Emesafene
Betaserc	Meclozine
Chloorcyclizine/ cinnarizine	Meclozine/pyridoxine
Cinnarizine	Primatour
Cyclizine	Suprimal
Doxylamine/pyridoxine	Xonvea

Antidepressiva

72 uur van tevoren staken, altijd in overleg met allergoloog!

Amitriptyline	Prothiaden
---------------	------------

Anafranil	Quetiapine
Clomipramine	Remeron
Dosulepine	Sarotex
Doxepine	Seroquel
Maprotiline	Sinequan
Mianserine	Tolvon
Mirtazapine	Trazodon
Nortrilen	Trazolan
Nortriptyline	Tryptizol

Longmedicatie

8 uur van tevoren staken

Aerolin	Combivent
Airomir	Fenoterol
Atrovent	Ipramol
Berodual	Ipratropium
Berotec	Salbutamol
Bricanyl	Terbutaline
Bronchodual	Ventolin

Longmedicatie

24 uur van tevoren staken

Atimos	Oxis
Bricanyl retard	Salmeterol
Cromoglicinezuur	Seretide
Foradil	Serevent
Formoterol	Spiriva
Foster	Symbicort
Lomudal	Tilade
Nedocromil	Tiotropium

Longmedicatie, 48 uur van tevoren staken

Theofylline
Theolair retard

Longmedicatie, 72 uur van tevoren staken

Montelukast
Singulair

Medicijnen tegen hoesten 72 uur te voren staken:

Oxomemazine
Toplexil

**Bètablokkers, 48 uur van tevoren staken,
altijd in overleg met allergoloog!**

Acebutalol	Metoprolol
Atenolol	Nebilet
Bisoprolol	Nebivolol
Carvedilol	Oxprenolol
Celiprolol	Pindolol
Dilanorm	Propranolol
Emcor	Sectral
Eucardic	Selokeen
Kerlon	Sotalol
Labetalol	Viskeen

**Maag/darm medicijnen
72 uur van tevoren staken**

Axid	Pepcidin
Cimetidine	Ranitidine
Famotidine	Tagamet
Nizatidine	Zantac
Pepcid	