

Provocatietest voeding/geneesmiddel

Toestemmingsformulier/informed consent

Onze testen wordt uitgevoerd conform (inter)nationale wetenschappelijke richtlijnen. Het doel is dat de test betrouwbaar, goed en zo veilig mogelijk verloopt. Daarom is ook uw informatie en medewerking belangrijk.

We informeren u zo goed mogelijk over de test, die we bij u zouden willen doen, zodat u weet wat de mogelijke voor- en nadelen en gevaren van de test zijn. Ook wat de alternatieven ervoor zijn. Uw internist-allergoloog zal dit met u bespreken. Als de informatie begrepen is en uw toestemming is verkregen, kan het onderzoek of de behandeling plaatsvinden.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek allergologie, telefoonnummer 088 708 52 30.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Provocatietest voeding/geneesmiddel

Voordelen

De test kan in veilige omgeving aantonen of u wel of niet allergisch bent voor het geteste voedingsmiddel of geneesmiddel.

Als er geen onmiddellijke reactie optreedt bij deze test, dan is er geen verhoogde kans meer op een onmiddellijke levensgevaarlijke allergische reactie bij een volgende consumptie of gebruik van het geteste middel.

Het is dan niet langer nodig om dit middel te vermijden om een volgende reactie te voorkomen. Een EpiPen is dan niet langer nodig. Dat is een hele geruststelling en opluchting. Als er wel een allergische reactie optreedt dan is allergie voor het geteste middel bevestigd. Dan dient het geteste middel levenslang te worden vermeden om een volgende gevaarlijke reactie te voorkomen. Advies hierover door uw internist-allergoloog is nodig. In een enkel geval is een behandeling mogelijk.

Risico's en nadelen

Bij een subcutane provocatietest kan de patiënt flauwvallen. Deze mensen worden dan tijdens de test bleek, klam en duizelig door een angstreactie van het lichaam. De arts zal u dan goed onderzoeken en geruststellend optreden.

Zeer zelden kan een ernstige onmiddellijke allergische reactie op: 'anafylaxie' genaamd, optreden.

Anafylaxie is een ernstige onmiddellijke levensbedreigende allergische reactie. Hierbij ontstaat jeuk over het hele lichaam, roodheid en zwellingen van de huid en ademhalingsproblemen door zwelling van de keel, die de luchtweg belemmert, jeukende ogen, niezen, jeuk in de keel, hoesten, piepen en benauwdheid door astma, sufheid, wegvallen, snelle hartslag en bloeddrukdaling. Misselijkheid met spugen en buikkrampen kunnen daarbij ook optreden.

Omdat deze reacties binnen een uur na een toediening kunnen optreden en dan onmiddellijke levensreddende behandeling nodig is, moet u altijd gedurende minimaal een uur na het einde van de test in de wachtkamer blijven (!!). Pas nadat u toestemming van de assistente en/of uw arts heeft gekregen, mag u de poli verlaten, nooit eerder (!).

Zodra u merkt dat u klachten krijgt van huid, neus, ogen of longen, of wanneer u zich niet lekker gaat voelen, moet u dit direct aan de secretaresse in de wachtkamer of één van onze assistenten melden.

Bij klachten zal de assistente direct uw behandelend internist-allergoloog waarschuwen. Deze kan de klachten goed behandelen, en zal zo nodig u een levensreddende behandeling met onder andere adrenaline geven.

Daarom mag u tijdens de test de polikliniek allergologie niet verlaten en dient u in de wachtkamer onder toezicht van het secretariaat te blijven. Wilt u naar het toilet, dan dient u de secretaresse vooraf hiervan op de hoogte te stellen.

Vertraagde anafylactische reacties (nadat u het ziekenhuis heeft verlaten) zijn nog zeldzamer. Mocht dit toch wel het geval zijn, dan moet u 112 bellen. Wij hebben dit nog overigens nog nooit meegemaakt

Bij de provocatietest mag uw gezondheidstoestand niet verslechterd zijn, in vergelijking met het moment dat de arts het onderzoek met u afsprak. Is deze wel verslechterd, overleg eerst met ons secretariaat. Zwangerschap is ook een reden om de test niet te doen, vanwege de kans op anafylaxie.

Belangrijk en essentieel is, dat u 3 dagen tevoren medicijnen moet stoppen, die de testuitslag verstoren of eventueel allergische reacties verergeren en/of de anafylaxie behandeling met adrenaline belemmeren. Bij de informatie over de uitvoering van de test wordt vermeld welke medicamenten dit zijn. Het stoppen van medicatie mag niet gebeuren zonder overleg met u, de internist-allergoloog en andere behandelaars van u.

Op bijgevoegd formulier staan welke medicijnen u voorafgaand aan de test tijdelijk moet laten staan, en hoe lang u dit van te voren moet laten staan. Het tijdelijk stoppen van medicijnen moet u in overleg doen met uw internistallergoloog.

Alternatief voor de test:

De internist-allergoloog kan op basis van uw klachten, huidtesten en eventueel bloedonderzoek (specifiek IgE) bepalen of u wel niet allergisch bent voor het voedingsmiddel of geneesmiddel en hoe hoog de kans is, dat u bij een volgende inname allergisch zal reageren. Een provocatietest kan meer zekerheid en duidelijkheid geven, indien dit nodig is.

Nb. Niet van ieder voedingsmiddel of geneesmiddel bestaat er een huidtest en/of een bloedonderzoek.

De uitslag van het bloedonderzoek komt pas binnen enkele dagen tot een week.

Toestemming provocatietest voeding/geneesmiddel

Ondergetekende patiënt verklaart dat hij/zij

1. de informatie over deze test begrepen heeft;
2. de voor- en nadelen, de eventuele risico's en alternatieven besproken zijn;
3. vrijwillig instemt met het ondergaan van deze test;
4. de poli niet zal verlaten totdat de assistente en/of de arts hiervoor toestemming geeft.

Datum: Plaats:

Naam:

Geboortedatum:

Handtekening:

N.B. Bij minderjarigen dient een van de ouders/verzorgers dit formulier te ondertekenen.