

Nitrostat, Nitrospray en Isordil

Uw behandelend medisch specialist heeft u één van de medicijnen Nitrostat, Nitrospray of Isordil voorgeschreven. Het is voor uw behandeling belangrijk dat u weet hoe u deze medicijnen moet gebruiken en hoe ze werken. In deze folder geven wij u hierover meer informatie.

Werking van de medicijnen

De medicijnen worden voorgeschreven als u last heeft van een beklemmend gevoel of drukkende, stekende pijn op de borst. Dit kan het gevolg zijn van een tekort aan zuurstof in de hartspier.

Zuurstof wordt via het bloed naar de kransslagaders vervoerd. De kransslagaders voorzien de hartspier van bloed.

Wanneer de kransslagaders vernauwd zijn of zich tijdelijk vernauwen (spasme) dan kan dit klachten geven van pijn op de borst. Als u deze klachten heeft, moet u een tabletje Nitrostat, Isordil of de Nitrospray gebruiken. Deze medicijnen verwijden de kransslagaders. Hierdoor gaat er meer bloed, en dus ook zuurstof, naar de hartspier. De klachten verdwijnen daardoor.

Het innemen van de medicijnen

Bij inname van de medicijnen is het verstandig even rustig te gaan zitten of liggen. Stop even met de werkzaamheden waarmee u bezig was. Door de rust heeft uw hart minder zuurstof nodig en zullen de klachten sneller verdwijnen.

Het gebruik van de tabletten Nitrostat en Isordil

Bij pijnklachten op de borst legt u één tabletje onder de tong en laat dit smelten. Dus **niet** doorslikken. U mag dit zo nodig na tien minuten herhalen, totdat de pijnklachten zijn verdwenen.

Houdt u, na inname van meerdere tabletjes (maximaal twee), nog steeds pijnklachten op uw borst? Waarschuw dan uw huisarts.

Het gebruik van Nitrospray

Bij pijnklachten op de borst één keer onder de tong sprayen. U mag dit zo nodig na tien minuten herhalen, totdat de pijnklachten zijn verdwenen.

Houdt u, na inname van meerdere sprays (maximaal twee), nog steeds pijnklachten op uw borst? Waarschuw dan uw huisarts.

Eventuele bijwerkingen

U kunt door de vaatverwijdende werking in sommige gevallen last krijgen van: duizeligheid, hoofdpijn, rood gelaat.

Zorg dat u altijd een busje spray of enkele tabletjes binnen handbereik heeft. De rest van de medicijnen kunt u in de koelkast bewaren. Pas op: tabletjes zijn niet onbeperkt houdbaar.

Vragen

Als u nog vragen heeft over één van deze medicijnen, stel ze dan gerust. Uw medisch specialist of de verpleegkundige wil ze graag voor u beantwoorden. Of neem contact op met de polikliniek cardiologie.

Bereikbaar op werkdagen, van 8.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.30 uur op 088 708 33 00 of mail naar cardiologie@zgt.nl

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

cardiologie