

SunRISe-4, Arm 1 TAR-200 + Cetrelimab

U gaat deelnemen aan de SunRISe-4 studie. U begint met een combinatie therapie bestaande uit chemotherapie en immunotherapie.

Deze behandeling bestaat uit twee medicijnen, TAR-200 (gemcitabine) en Cetrelimab. Omdat de TAR-200 ingebracht en verwijderd moet worden staat deze in twee stappen beschreven.

1. **I**nbrengen TAR-200 (gemcitabine)
2. **V**erwijderen TAR-200
3. **C**etrelimab

Weeknummers

0	3	6	9	12
I	V	V	V	V
C	I	I	I	
	C	C	C	

Wijze van toediening

Het inbrengen en verwijderen van de TAR-200 zal plaatsvinden op het behandelcentrum van de urologie. Het inbrengen van het implantaat gebeurt door middel van een cystoscopie rechtstreeks in de blaas. Na 3 weken verwijderen we deze met een cystoscopie. Afhankelijk van het weeknummer in het schema wordt er op hetzelfde moment weer een nieuwe TAR-200 geplaatst.

De behandeling van Cetrelimab vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van de ZGT. De eerste toediening van Cetrelimab duurt ongeveer een uur. Indien de eerste toediening zonder bijzonderheden is verlopen duren de volgende toedieningen ongeveer een half uur. Het is belangrijk dat u eventuele klachten tijdens de toediening direct meldt aan de oncologieverpleegkundige.

TAR-200

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Het kan zijn dat u na het inbrengen of verwijderen van de TAR-200 tijdelijk vaker moet plassen, bij sommige patiënten houden deze klachten langer aan.
- Moeite met het ophouden van urine
- Pijn bij het plassen
- Bloed in de urine
- Urineweginfectie

Almelo

Zilvermew 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 zgt.nl/mijnzgt

 zorgkaart <http://bit.ly/1y7WjbP>

 facebook.com/zgtinfo

 linkedin.com/company/zgt

 twitter.com/zgt_info

 youtube.com/user/zgtinfo

Het medicijn Gemcetabine kan de volgende bijwerkingen geven:

- Het kan zijn dat u misselijk wordt of moet braken
- Er kunnen griepachtige symptomen ontstaan
- Huiduitslag, droge, rode huid of jeuk
- Haaruitval
- Zweertjes in de mond
- Spierzwakte
- Gevoelloosheid en tintelend gevoel
- Resten cytostatica kunnen tot dag zeven in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om moet gaan.

Cetrelimab**Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:**

- Het kan zijn dat u lichamelijke zwakte en/of krachtverlies ervaart
 - Kortademigheid en of hoesten
 - Diaree (waterige, dunne of zachte ontlasting)
 - Misselijkheid en/of braken
 - Verminderde eetlust
 - Pijn in de spieren, botten, rug, maag of gewrichten
 - Huiduitslag, droge, rode huid of jeuk
 - Verandering in bloedwaarden
- **Bij koorts boven de 38,5 graden moet u contact met ons opnemen.**

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.