


Ganglion Stellatum blokkade

In overleg met u is een afspraak gemaakt voor een Stellatum blokkade. Vooraf aan deze behandeling zal er een proefblokkade van het ganglion van Stellatum worden verricht. Vermindert de proefblokkade duidelijk u pijn dan volgt de Stellatum blokkade. Hieronder leest u wat de behandeling inhoudt en hoe deze verloopt.

Wat is een Ganglion Stellatum blokkade?

Een ganglion is een zenuwknoop waar tal van zenuwbanen tezamen komen. Bij bepaalde pijnklachten spelen deze zenuwknoten een belangrijke rol. Het ganglion Stellatum ligt laag in de hals naast de zevende nekwerfel. Het is een aanknopingspunt voor de behandeling van sommige soorten pijn vanuit de nek, schouder, kaak en arm.



Vooraanzicht van de borstkas bij de nek met de rode slagaders naar de armen en de halswervelkolom.

Belangrijk

Neem contact op met Nocepta indien dit voor u van toepassing is:

- U gebruikt bloedverdunners.
- U bent (mogelijk) zwanger.
- U bent allergisch voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen.
- U heeft een pacemaker of ICD.
- U heeft geen pijn meer.
- U bent de dag van de behandeling ziek of u heeft koorts.

Vorbereiding

- U mag van tevoren eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn.
- U kunt uw medicatie gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt.
- Na de behandeling mag u de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand met u meerijsdt.
- Draag makkelijk zittende kleding.

Behandeling

De behandeling vindt plaats in de behandelkamer van Nocepta.

U kunt zich melden bij Nocepta in de ontvangstruimte. Vervolgens wordt u naar de betreffende ruimte gebracht. U komt op u rug op de behandeltafel te liggen. De huid wordt gedesinfecteerd en plaatselijk verdoofd waarna de pijnspecialist onder echogeleiding de naald op de juiste plaats brengt. Ook wordt er contrastvloeistof toegediend om de positie van de naald te controleren.

Proef Stellatumblokkade

Voordat het ganglion Stellatum definitief behandeld kan worden verrichten we een proefblokkade. Bij een proefblokkade wordt een injectie verricht met een kortwerkende lokale verdoving. Indien uw pijn tijdens de werking van deze verdoving duidelijk verminderd wordt er een afspraak gemaakt voor een definitieve Stellatum blokkade. Als de proefblokkade weinig tot geen effect op de pijn heeft, volgt een poliklinische controleafspraak om eventuele andere behandelingsmogelijkheden te bespreken.

Definitieve Stellatum blokkade

Bij de definitieve blokkade wordt er na plaatsing van de naald twee medicijnen ingespoten; een lokale verdoving en een sterke ontstekingsremmer (corticosteroid).

In sommige gevallen is het mogelijk om het ganglion Stellatum te behandelen met een hoogfrequent elektrisch signaal. Via een naald wordt dan een elektrisch stroompje bij dit ganglion gegeven waardoor deze plaatselijk verwarmd wordt. Hierdoor wordt de pijngleiding in de dunne zenuwtjes van het ganglion geremd. De geleiding en functie in de dikke zenuwtjes blijven normaal.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u naar de aftercare.

U kunt een verdoofd gevoel of krachtsvermindering hebben aan de behandelde kant, reden waarom u na de behandeling niet zelf actief deel mag nemen aan het verkeer.

Behandelingsduur

De definitieve behandeling duurt ongeveer 30 minuten. De pijnspecialist spreekt met u de tijd af wanneer u naar huis mag. De totale opname duurt meestal twee uur, maar iedere patiënt reageert verschillend op een behandeling. De nazorg kan hierdoor zowel korter als langer duren.

Resultaat

Bij de proefbehandeling bespreekt u het resultaat direct met uw pijnspecialist. Daarna wordt met u een afspraak gemaakt over eventuele verdere behandeling.

Bij de behandeling met medicatie en/of stroom zal de verdoving gemiddeld na 1-2 uur uitwerken. Hierna komen de oorspronkelijke pijnklachten weer terug. Gemiddeld duurt het 2-3 weken voordat er een effect van de behandeling merkbaar wordt. Er volgt altijd een controle afspraak 6-8 weken na de behandeling om het tot dat moment behaalde resultaat te bespreken.

Risico's of bijwerkingen

Ernstige complicaties komen slechts uiterst zelden voor. Wel zijn er een aantal bijwerkingen.

- In veel gevallen treedt na de behandeling napijn op. Deze pijn kan enkele weken aanhouden, maar is vrijwel altijd van tijdelijke aard. U kunt hiervoor een pijnstillert innemen, zoals Paracetamol (volgens bijsluiter) of uw eigen pijnstillende medicatie.
- Infectie. Wanneer u koorts krijgt na de behandeling, neemt u dan contact op met Nocepta.
- Bloeduitstorting als gevolg van de prik. Dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook wat napijn
- Er bestaat een zeer kleine kans dat de long wordt aangeprikt. Wordt u na de behandeling kortademig? Neem dan contact op met het Pijncentrum of met de Spoedeisende Hulp.
- Heesheid of slikklachten. De klachten verdwijnen na enkele uren vanzelf.
- Hangend ooglid, wazig zien en/of een loopneus. De klachten verdwijnen na enkele uren vanzelf.
- Een warm gevoel in uw wang, nek en in uw arm.

Vragen

Als u voorafgaand aan uw behandeling medisch inhoudelijke vragen heeft óf vragen heeft over bijwerkingen na een behandeling anders dan genoemd in de folder, dan kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur van Nocepta op maandag t/m vrijdag tussen 11:00 en 12:00 uur ☎ 088-708 7060.

Het secretariaat is op werkdagen te bereiken van 08:30-12:00 uur en van 13:00-15:30 uur op ☎ 088-708 5080.

Anesthesiologen-pijnspecialist

E.H. Gensen-Alblas

M. Hanje

F.A.J. Klaassen

N.P. Monteiro de Oliveira

M.A. Richardson

BIG-nummer

49060674401

19051845201

19049907901

29913238101

09062515801

Anesthesiologen-pijnspecialist

C. Robers

A.C.W. Setz

Dr. M. Uslu

D.H.K. Flipse

BIG-nummer

19023503301

69048621701

29059938001

89920999301

Physician assistant

M. Wijnstra

E. Benneker

R. ter Riet

BIG-nummer

79050319581

09017103381

89930799581