

## Huidtest bij en wesp

Met behulp van deze test kan worden onderzocht of u allergisch bent voor bijen- en/of wespengif. Dit onderzoek zal ongeveer 30 minuten duren.

### Verloop van het onderzoek

Deze test wordt gedaan met een testvloeistof waarin het bijen- en wespengif is opgelost. Er wordt begonnen met een zeer lage concentratie van deze giften. De vloeistof zal op de binnenkant van uw onderarm worden gedruppeld.

Met een 'prikkertje' (lancet) wordt de huid aangeprikt, zodat de vloeistof net onder de huid contact kan maken. Na ongeveer 15 minuten wordt de uitslag van de test worden bekeken.

Als de test niet of niet genoeg opkomt, dan wordt de test herhaald met een hogere concentratie van de testvloeistof.

Bij een reactie op de testvloeistof zal er een iets jeukende, rode uitslag ontstaan op de plek waar u geprikt bent. Deze zal overigens snel weer wegtrekken.

### Vorbereidingen thuis

- Stop 48 uur (2 dagen) of 72 uur (3 dagen) voor de test met medicijnen die op de achterkant op bladzijde 2 van deze folder staan. Overleg altijd van tevoren met de allergoloog als het gaat om medicijnen tegen depressie of bètablokkers.
- Gebruik geen bodylotion en dergelijke op de onderarmen.

### Uitslag

De allergoloog die u behandelt vertelt u de uitslag van het onderzoek.

### Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel ze dan gerust. Tussen 8.30 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 16.30 uur kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek allergologie, telefoonnummer 088 708 52 30.

### Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: [zgt.nl/mijnzgt](http://zgt.nl/mijnzgt).

#### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 [facebook.com/ZGTinfo](https://facebook.com/ZGTinfo)

 [twitter.com/ZGT\\_info](https://twitter.com/ZGT_info)

 [linkedin.com/company/zgt](https://linkedin.com/company/zgt)

 [youtube.com/user/ZGTinfo](https://youtube.com/user/ZGTinfo)

 [zgt.nl](http://zgt.nl) - [zgt.nl/mijnzgt](http://zgt.nl/mijnzgt)

## Lijst van medicijnen welke gestopt moeten worden voordat de test gedaan kan worden

### Medicijnen tegen allergie en jeuk 72 uur van tevoren stoppen

acrivastine	mehydroline
Aerius	mizolastine
alimemazine	Mizollen
Allerfre	montelukast
Allergodil (Azelastine)	Nalcrom
Atarax	Nedeltran
cetirizine	Neoral
ciclosporine	oxatomide
Claritine	Periactin
clemastine	Polaramine
cromoglicinezuur	Prevalin
cyproheptadine	promethazine
desloratadine	Reactine
dexchlorfeniramine	Rupatadine
dimetindeen	Rupafin
Dymista	Semprex
ebastine	Singulair
Fenistil	Tavegil
fexofenadine	Telfast
hydroxyzine	terfenadine
Kestine	Tinset
ketotifen	Xyzal
levocetirizine	Zaditen
Livocab (Levocabastine)	Zyrtec
Lomudal	
loratadine	

### Medicijnen tegen misselijkheid/duizeligheid 72 uur van tevoren stoppen

betahistine	Emesafene
Betaserc	meclozine
chloorcyclizine/ cinnarizine	meclozine/pyridoxine
cinnarizine	Primatour
cyclizine	Suprimal
Doxylamine/pyridoxine Xonvea	

### Antidepressiva 72 uur van tevoren stoppen

amitriptyline	Prothiaden
Anafranil	Quetiapine
clomipramine	Remeron
dosulepine	Sarotex
doxepine	Seroquel
maprotiline	Sinequan
mianserine	Tolvon
mirtazapine	trazodon
Nortrilen	Trazolan
nortriptyline	Tryptizol

### Bètablokkers 48 uur van tevoren stoppen

Acebutalol	Metoprolol
Atenolol	Nebilet
Bisoprolol	Nebivolol
Carvedilol	Oxprenolol
Celiprolol	Pindolol
Dilanorm	Propranolol
Emcor	Sectral
Eucardic	Selokeen
Kerlon	Sotalol
Labetalol	Viskeen

### Maag/darm medicijnen 72 uur van tevoren stoppen

Axid	Pepcidin
cimetidine	ranitidine
famotidine	Tagamet
nizatidine	Zantac
Pepcid	

### Medicijnen tegen hoesten 72 uur van tevoren stoppen

Oxomemazine	
Toplexil	